Научная статья

УДК 619:616.053.2:612.1+636.4.033

Применение кормовой добавки антидиарейного действия для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний цыплят

Валентина Ивановна Раицкая

Научно-исследовательский институт аграрных проблем (НИИАП) Хакасии – филиал ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН), г. Абакан, Республика Хакасия

Аннотация: *Препарат «Афлуксид» обладает антидиарейным действием, легко вписывается в технологию содержания сельскохозяйственных животных и птиц в случаях неосложненного колибактериоза, сальмонеллеза. Целью исследований было изучить влияние терапевтического и профилактического использования препарата при кишечных инфекциях цыплят на их сохранность и биохимический состав крови. Исследования проводили на двух группах цыплят яичного кросса «Декалб»: по 15 голов в каждой – с профилактической целью с 1 по 7 день выращивания; и по 10 голов в каждой – с лечебной целью до полного выздоровления. Контрольным группам выпаивали препарат «ЭМ-Вита», в рационы опытных групп вводили «Афлуксид» в дозах 1,0 и 1,5 г/кг живой массы с профилактической и лечебной целью соответственно. В 8- и 15-дневном возрасте проведен биохимический анализ крови. Из фекалий заболевших цыплят были выделены Escherichia coli с адгезивными антигенами K99 и A20, Proteus vulgaris, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa. Установлено, что включение препарата «Афлуксид» в основной рацион с лечебной целью в дозе 1,5 г/кг живой массы в сутки (по данным группового взвешивания) способствовало улучшению биохимического состава крови, снижало диарейные явления, вдвое сокращало сроки лечения, а сохранность цыплят составила 90% в лечебном опыте (против 80% в контроле) и 100% – в профилактическом (против 93,3% в контроле). Сделан вывод, что изучаемый препарат можно эффективно использовать для профилактики и терапии желудочно-кишечных болезней цыплят в условиях Республики Хакасия с увеличением сохранности молодняка на 10-20%.*

Ключевые слова: *цыплята, желудочно-кишечные болезни, антидиарейный препарат, сохранность, биохимические показатели крови.*

Для цитирования: *Раицкая, В.И. Применение кормовой добавки антидиарейного действия для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний цыплят / В.И. Раицкая // Птицеводство. – 2026. – №5. – С. 54-58.*
doi: 10.33845/0033-3239-2026-75-6-54-58

Введение. Промышленное разведение домашней птицы – это одно из ведущих направлений животноводства, позволяющее за короткое время получить недорогое мясо высокого качества. Все чаще потребитель выбирает мясо птицы, при выращивании которого не были использованы антибиотики [1].

Среди заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных и птиц особенное место занимает диарея (диспепсия) – обобщенное наименование острых желудочно-кишечных болезней [2,3], характеризующихся разной тяжестью течения, от непродолжительного легкого расстройства системы пищеварения до обезвоживания организма, токсикоза и гибели животных. Известно, что здоровый кишечник является наиболее важным условием для трансформирования питательных веществ в продукцию [4,5].

Традиционные классы фармакологических средств все чаще оказываются терапевтически неэффективными, т.к. микроорганизмы достаточно быстро вырабатывают к ним устойчивость; кроме того, от них страдает симбиотическая микрофлора, обеспечивающая не только нормальный процесс пищеварения, но и конкурентное ингибирование патогенных бактерий [6].

Кроветворные органы чувствительно реагируют на различные физиологические и, в особенности, на патологические воздействия на организм изменением картины крови. Поэтому исследование крови имеет большое диагностическое значение.

Создавшаяся ситуация требует коррекции системы профилактики и лечения массовых болезней органов пищеварения сельскохозяйственных животных и птиц с учетом складывающейся экологической ситуации в отдельно взятом регионе [7-9].

Разработанный в ООО «Биорост» препарат «Афлуксид» является кормовой добавкой и представляет собой порошок от серо-белого до серо-желтого цвета со слабым запахом ванилина. В состав входят: бентонит – 55,0-59,0%, (ионообменная емкость – не менее 55 мг-экв/100 г), глюкоза – 29,0-32,0%, цитрат натрия – 4,5-6,0%, натрия хлорид – 2,5-4,5%, калия хлорид – 2,0-3,0 %, сахарин натрия – 0,25-0,45% и ванилин – 0,1-0,2%.

Добавка обладает антидиарейным свойством, легко вписывается в технологию содержания сельскохозяйственных животных, в случаях колибактериоза препарат эффективен при изолированном применении. Действие обусловлено его адсорбционными свойствами, благодаря которым при нарушении работы пищеварительного тракта из организма выводятся токсичные вещества. Действие всех компонентов добавки нормализует процессы пищеварения, в т.ч. в периоды стресса и при смене рационов.

Материал и методика исследований. Экспериментальное исследование отечественного препарата «Афлук-

Таблица 1. Профилактическая эффективность препарата «Афлуксид» у цыплят

Показатель	Группа	
	Контрольная	Опытная
	Препарат и доза	
	ЭМ-Вита 1 мл/л	Афлуксид 1 г/кг живой массы
Поголовье на начало опыта	15	15
Переболело цыплят за период опыта:		
гол.	4	7
%	26,6	46,7
Поголовье на конец опыта	14	15
Падеж за период опыта, гол.	1	-
Срок лечения, сут.	4	2
Сохранность, %	93,3	100

сид» производства компании ООО «Биорост» проведено в ЭМ «Хозяюшка птицевод» на цыплятах яичного кросса «Декалб» согласно методическим указаниям [5].

По принципу аналогов было сформировано 2 группы (контрольная и опытная) по 15 голов в каждой с профилактической целью и 2 группы (контрольная и опытная) по 10 голов – с лечебной. Цыплята получали кормосмеси (ПК-1) с суточного возраста согласно возрасту. Условия содержания соответствовали принятым зоогигиеническим параметрам.

Контрольные группы цыплят получали основной рацион + препарат «ЭМ-Вита» с питьевой водой (добавка, применяемая в хозяйстве) согласно инструкции разработчика (в дозе 1 мл/л воды). В профилактическом опыте вторая (опытная) группа получала основной рацион + «Афлуксид» в дозе 1 г/кг живой массы в сутки с суточного возраста в течение 7 суток; в лечебном опыте – в дозе 1,5 г/кг живой массы в сутки до полного выздоровления. Для определения необходимых количеств «Афлуксид» для скармливания опытным группам применяли групповое взвешивание.

Нормы посадки, световой, температурный, влажностный режимы, фронт кормления и поения во все возрастные периоды соответствовали рекомендациям и для всех групп были одинаковыми [5]. За развитием и состоянием здоровья цыплят контрольных и опытных групп вели наблюдение и учет путем проведения клинического осмотра.

Забор крови от цыплят в возрасте 8 и 15 дней (по 5 голов с каждой группы) для определения биохимических показателей проводили в утренние часы до кормления из подкрыльцовой вены. Биохимические исследования проведены в НИИАП Хакасии с использованием программируемого биохимического анализатора iMagis-s7.

В сыворотке крови цыплят определяли следующие показатели: общий белок, мочевая кислота, глюкоза, креатинин, активность АЛТ (аспартаминотрансферазы) и АСТ (аланинаминотрансферазы), билирубин.

Полученные данные обработаны статистически [10] в «Microsoft Excel», входящую в пакет программ «Microsoft XP 2003».

Результаты исследований и их обсуждение. При изучении эффективности использования препарата «Афлуксид» с профилактической целью проводили клинический осмотр цыплят. В первые сутки тело цыплят покрыто пухом желтого цвета. В первую неделю эксперимента пухоперьевой покров цыплят был чистый. Помет размягченной консистенции, серо-коричневого цвета с белыми прожилками. Цыплята активно передвигались по клетке, хорошо потребляли корм.

Во вторую неделю жизни отмечали рост перьев крыльев и хвоста, пух частично сохранен на теле птицы. Пока цыплята не обросли перьями, у них не работает терморегуляция, и температура тела птенцов напрямую зависит от температуры окружающей среды. В возрасте 1-7 дней температура тела цыплят составляет 33-35°С (ниже, чем у взрослых). Переохлаждение приводит к замедлению всех процессов жизнедеятельности и часто заканчивается летально, это одна из причин летальности при заболеваниях ЖКТ.

Сохранность цыплят за период эксперимента с профилактической целью в опытной группе составляла 100%, в то время как в контрольной – 93,3% (табл. 1). Анализ показывает, что павшие цыплята имели меньшую массу тела по сравнению со своими живыми сверстниками. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что добавление в рацион цыплят кормовой добавки «Афлуксид» оказывает положительное влияние на сохранность.

Вероятно, препарат способствовал улучшению адаптационных возможностей цыплят в этот самый критический для них период жизни, когда происходит формирование активного иммунитета, а также устойчивости к патогенам, которые могут способствовать заболеванию органов пищеварения. У цыплят, которым «Афлуксид» вводился в основной рацион в профилактических целях, симптомов диареи почти не отмечалось.

На основании полученных результатов с профилактической целью цыплятам рекомендуется применение препарата «Афлуксид» в дозе 1 г на 1 кг живой массы, с добавлением в основной рацион 1 раз в сутки в течение 7 дней, т.к. побочных явлений не отмечено, и процесс выздоровления проходил без осложнений.

В эксперименте с лечебной целью лечение цыплят контрольной и опытной групп начинали при появлении первых признаков диареи, но не ранее трех суток жизни. Из фекалий заболевших цыплят были выделены различные патогенные микроорганизмы: *Escherichia coli* с адгезивными антигенами К99 и А20, *Proteus vulgaris, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa.* Групповой диагноз устанавливали на основании результатов бактериологических анализов, клинической картины заболевания и результатов вскрытия павших цыплят. У больных цыплят регистрировали понос, появляющийся на третьи сутки.

Из данных табл. 2 видно, что сохранность цыплят за период эксперимента в опытной группе составляла 90%, в то время как в контрольной – 80%, а продолжительность

Таблица 2. Сохранность цыплят, %

Группа	Количество голов	Пало, гол.	Продолжительность болезни, дни	Сохранность, %
Контрольная	10	2	4	80
Опытная	10	1	2	90

Таблица 3. Биохимические показатели крови цыплят

		Показатели						
Возраст, дней	Группа	Глюкоза, мкмоль/л	Мочевая к-та, мкмоль/л	Креатинин, мкмоль/л	Общий белок, г/л	АЛТ, ед./л	АСТ, ед./л	Билирубин, мкмоль/л
8	К	5,8±0,12	230,5±0,36	78,6±0,59	28,9±0,19	23,7±0,27	125,3±0,13	4,2±0,65
	О	6,1±0,11	190,9±058*	74,5±0,19	32,6±0,25*	21,7±0,33*	130,0±0,18*	3,8±0,45*
15	К	5,7±0,25	217,7±0,27	69,9±0,28	33,1±0,37	24,2±0,08	132,0±0,54	3,7±0,25
	О	7,1±0,30	175,5±0,66*	66,7±0,22	35,7±0,55*	21,8±0,67*	143,6±0,32*	2,9±0,31*

Примечание - *p≤0,05.

болезни в контрольной группе была в два раза больше в сравнении с опытной группой и составила 4 дня. Павшие цыплята в обеих группах имели меньшую массу тела по сравнению со своими сверстниками. При вскрытии павших цыплят обнаружены изменения, характерные для кишечных инфекций. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что добавление в рацион цыплятам кормовой добавки «Афлуксид» оказывает положительное влияние на сохранность.

Следовательно, использование препарата «Афлуксид» не только предупреждает заболеваемость цыплят, но и положительно влияет на тяжесть течения болезни и сокращает сроки лечения.

В ходе исследований биохимических показателей крови цыплят (табл. 3) установлено, что в 8-дневном возрасте содержание мочевой кислоты в крови цыплят контрольной и опытной групп составило 230,5±0,36 и 190,9±0,36 ммоль/л соответственно (норма 150-450 ммоль/л), что значительно выше нижних референсных значений (на 53,6 и 27,2% соответственно). По-видимому, это связано с ослаблением их иммунной системы и воспалительным процессом.

Уровень мочевой кислоты в крови цыплят к 15-дневному возрасту, после курса терапии кормовых добавок (в контрольной группе – ЭМ-Вита и в опытной группе – «Афлуксид» с антидиарейным действием), снижается и составляет 217,7±0,27 и 175,5±0,66 мкмоль/л соответственно, за счет чего происходит повышение лизоцимной активности сыворотки крови на 8,5 и 10,2 %, что указывает на укрепление иммунной системы [11].

Уровень глюкозы в сыворотке крови у контрольных и опытных цыплят в 8-дневном возрасте находился в норме и составлял 5,8-6,1 мкмоль/л, что соответствует референсным значениям (5,8-15,1 мкмоль/л).

Уровень креатинина у цыплят опытной группы был выше на всем протяжении исследования. К концу эксперимента количество креатинина у особей, включенных в опыт, снижалось и составляло 69,9 мкмоль/л (25,3%) и 66,7 мкмоль/л (10,5%) соответственно. Креатинин играет важную роль в метаболизме мышечного белка. Возможно, что снижение этого показателя в конце опыта произошло из-за обезвоживания цыплят из-за проблем с доступом к воде и диареи. Креатинин также используется как индикатор функции почек; его изменения могут проявляться при судорогах, чрезмерной мышечной активности, стрессах, воспалениях. У молодняка птиц уровень креатинина очень изменчив и непостоянен. Это осложняет установление единой «нормы» для всего периода, в том числе до месяца жизни. Как и у других животных, рост уровня креатинина, в первую очередь, указывает на снижение скорости клубочковой фильтрации в почках [10].

При оценке активности АЛТ (аланинаминотрансферазы) нами было установлено, что ее значение в обеих группах находилось в пределах физиологической нормы, и к концу опыта составило 24,2±0,08 и 21,8±0,67 ед./л соответственно (норма 15,0-25,0 ед./л).

В тоже время, необходимо отметить, что у цыплят получавших вместе с основным рационом кормовые добавки ЭМ-Вита и «Афлуксид», значения активности АСТ (аспартатаминотрансферазы) были более низкие (125,3±0,13 и 132±0,54 ед./л) при норме 150-250 ед./л и находились ниже физиологических значений на 16,5 и 12,0%, соответственно.

Активность АСТ у подопытных цыплят к 15 дню эксперимента так и не приблизилась к физиологической норме и составила 132,0 ед./л (12,0%) и 143,6 ед./л (4,3 %), соответственно. В опытной группе, где цыплята получали кормовую добавку Афлуксид, этот показатель превосходил показатель контрольных цыплят на 11,6%.

АЛТ и АСТ – это эндогенные ферменты, характеризующие функциональное состояние организма птицы. Повышение АСТ при нормальной АЛТ может свидетельствовать о проблемах с мышцами.

Уровень билирубина у цыплят контрольной и опытной групп в 8-дневном возрасте составлял 4,2±0,65 и 3,8±0,45 мкмоль/л соответственно (норма 1,7-8,0 мкмоль/л). К концу эксперимента данный показатель также соответствовал физиологической норме и составил 3,7 и 2,9 мкмоль/л соответственно.

Содержание общего белка в сыворотке крови 8-дневных цыплят в контрольной и опытной группах составило 28,9 и 32,6 г/л (при норме 25,0-35,0 г/л), к 15-дневному возрасту данный показатель также соответствовал физиологически нормальным значениям и составил 33,1 и 35,7 г/л.

Для цыплят 8-15 дневного возраста относительно низкие или высокие показатели глюкозы, белка и АСТ, скорее всего, являются физиологически нормальными, так как это быстрорастущий организм.

Таким образом, можно сделать вывод, что препарат Афлуксид обладает стимулирующим действием на обменные процессы в организме цыплят, о чем свидетельствует

показатели общего белка, мочевой кислоты, что указывает на укрепление иммунной системы. Сохранность цыплят составила 90%.

В контрольной группе цыплят продолжительность болезни увеличилась в два раза в сравнении с опытной группой, сохранность составила 80%.

Заключение. Применение цыплятам кормовой добавки «Афлуксид» с антидиарейным действием с лечебной целью против желудочно-кишечных болезней в дозе 1,5 г/кг живой массы способствовало сокращению основных клинических проявлений диареи, улучшало биохимический состав сыворотки крови (концентрации общего белка и мочевой кислоты), что указывает на укрепление иммунной системы, а сохранность составила 90%. При этом в контрольной группе продолжительность болезни увеличилась в два раза в сравнении с опытной группой, а сохранность составила 80%. При скармливании добавки в дозе 1,0 г/кг живой массы в первые 7 дней жизни с профилактической целью сохранность цыплят повысилась с 93,3% в контроле до 100%.

Литература

1. Бузаев, Т.У. Повышение продуктивности и резистентности цыплят-бройлеров / Т.У. Бузаев // Приоритетные научные направления: от теории к практике. - 2015. - №18. - С. 67–71.
2. Фисинин, В.И. Кормление сельскохозяйственной птицы / В.И. Фисинин, И.А. Егоров, И.Ф. Драганов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 344 с.
3. Клетикова, Л. Изменение белково-минерального обмена в организме птицы Л. Клетикова // Птицеводство. - 2009. - №7. - С. 29-30.
4. Каблучеева, Т. Значение БАВ для пищеварительной системы птицы // Птицеводство. - 2007. - №2. - С. 17-19.
5. Шахов, А.Г. Методические рекомендации по оценке и коррекции неспецифической резистентности животных / А.Г. Шахов, Ю.Н. Бригадиров, А.И. Ануфриев [и др.]. - Воронеж: Истоки, 2005. - 62 с.
6. Горячева, М.М. Альтернатива антибиотикам / М.М. Горячева // Птица и птицепродукты. - 2013. - №1. - С. 16-19.
7. Петенко, А.И. Перспективы применения полезной микрофлоры в составе пробиотических добавок к корму и биоутилизации помета для цыплят-бройлеров / А.И. Петенко, А.И. Ющенко, Е.В. Якубенко, А.Н. Гнеуш // Ветеринария Кубани. - 2014. - №5. - С. 3-6.
8. Лахов, С.Д. Опыт применения многокомпонентной кормовой добавки на основе бентонитовой глины в животноводстве / С.Д. Лахов, Ю.В. Петрова, В.М. Бачинская // Иппология и ветеринария. - 2022. - №1. - С. 82-88.
9. Кондрахин, И.П. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии: Спр. издание / И.П. Кондрахин. - М.: Агропромиздат, 1985. - 287 с.
10. Плохинский, Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. - М.: Колос, 1969. - 304 с.
11. Раицкая, В.И. Сезонные изменения гематологических и биологических показателей крови герефордского скота / В.И. Раицкая // Молочное и мясное скотоводство. - 2020 - №6. - С. 55-58.

Сведения об авторе:

Раицкая В.И.: кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник; v.raitskaya@yandex.ru.

Статья поступила в редакцию 29.01.2026; одобрена после рецензирования 25.03.2026; принята к публикации 21.04.2026.

Research article

Application of an Anti-Diarrheal Feed Additive for the Prevention and Treatment of Dysbiosis in Chicks

Valentina I. Raitskaya

Research Institute of Agrarian Problems of Khakassia – branch of Federal Scientific Center “Krasnoyarsk Research Center of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences”, Abakan, Khakassian Republic

Abstract. *An anti-diarrheal preparation Afluksid was developed for the use in cases of uncomplicated colibacilloses, salmonelloses, and other gastrointestinal diseases in animals and poultry resulting in dysbioses and diarrhea. The aim of the study presented was the evaluation of the effects of preventive and therapeutic application of the preparation on mortality and blood biochemistry in growing chicks. The trials were performed on two treatments of Dekalb chicks: in the trial with the preventive application the birds (15 birds per treatment) were fed the preparation in dose 1.0 g/kg of live bodyweight during the first 7 days of age; in the trial with the therapeutic application ill chicks (10 birds per treatment) were fed the preparation in dose 1.5 g/kg of live bodyweight until the recovery. Chicks of control treatments were given preparation EM-Vita (1 mL/L) with drinking water. Blood for biochemical analysis was sampled at 8 and 15 days of age. In feces of ill chicks Escherichia coli with adhesins K99 and A20, Proteus vulgaris, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa were identified. It was found that the therapeutic application of the preparation improved blood biochemistry, decreased the severity of diarrhea, shortened the recovery period two-fold. Mortality in the preventive trial was 0% vs. 6.7% in control, in the therapeutic trial 10% vs. 20% in control. The conclusion was made that the preparation studied can be effectively used for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders in growing chicks in conditions of Khakassian Republic and can decrease mortality by 10-20%.*

Keywords: *chicks, gastrointestinal disorders, anti-diarrheal preparation, mortality, biochemical blood parameters.*

For Citation: *Raitskaya V.I. (2026) Application of an anti-diarrheal feed additive for the prevention and treatment of dysbiosis in chicks. Ptitsevodstvo, 75(5): 54-58. (in Russ.)*
doi: 10.33845/0033-3239-2026-75-6-54-58

References

1. Buzaev TU (2015) Improving the productivity and resistance of broiler chickens. *Priority Scientific Areas: From Theory to Practice*, (3): 31-7 (in Russ.). **2.** Fisinin VI, Egorov IA, Draganov IF (2011) Nutrition of Poultry. Moscow, GEOTAR-Media Publ., 344 pp. (in Russ.). **3.** Kletikova L (2009) Changes in protein-mineral metabolism in birds. *Ptitsevodstvo*, (7): 29-30 (in Russ.). **4.** Kablucheeva T (2007) The value of BAS for the digestive system of poultry. *Ptitsevodstvo*, (2): 17-9 (in Russ.). **5.** Shakhov AG, Brigadirov YN, Anufriev AI [et al.] (2005) Methodological Recommendations on the Assessment and Correction of Non-Specific Immunity in Animals. Voronezh, Istoki Publ., 62 pp. (in Russ.). **6.** Goryacheva MM (2013) An alternative to antibiotics. *Poult. Chicken Prod.*, (1): 16-9 (in Russ.). **7.** Petenko AI, Yushchenko AI, Yakubenko EV, Gneush AN (2014) Prospects for the use of beneficial microflora as part of probiotic feed additives for broilers and for bioutilization of manure. *Vet. Kuban*, (5): 3-6 (in Russ.). **8.** Lakhov SD, Petrova YV, Bachinskaya VM (2022). Experience in the use of a multicomponent feed additive based on bentonite clay in animal husbandry. *Hippol. Vet. Med.*, (1): 82-8 (in Russ.). 9. Kondrakhin IP (1985) Clinical Laboratory Diagnostics in Veterinary Medicine. Moscow, Agropromizdat Publ., 287 pp. (in Russ.). **10.** Plokhinsky NA (1969) Manual on Biometrics for Animal Technicians. Moscow, Kolos Publ., 304 pp. (in Russ.). **11.** Raitskaya VI (2020). doi: 10.33943/MMS.2020.63.73.009 (in Russ.).

Author:

Raitskaya V.I.: Cand. of Vet. Sci., Senior Research Officer; v.raitskaya@yandex.ru.

Submitted 29.01.2026; revised 25.03.2026; accepted 21.04.2026.

© Раицкая В.И., 2026

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

Россия занимает 9% мирового экспортного рынка индейки

Сейчас Россия активно развивает поставки индейководческой продукции на новые рынки и это, прежде всего, страны Юго-Восточной Азии. В результате доля страны в мировом экспорте этого вида мяса достигла 9%, при это 99% рынка КНР – это российская индейка, 100% – для Саудовской Аравии. Об этом рассказал президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев в ходе саммита «Аграрная политика России». По его словам, Россия занимает лидирующее место по поставкам и в другие страны, но объемы отгрузок не столь велики из-за низкого курса рубля. Впрочем, по его мнению, добиться роста экспорта до 10% от производства к 2030 году (примерно 65 тыс. т, сейчас – 8%) вполне реально.

Давлеев уверен, что перед российскими производителями индейки открываются широкие экспортные перспективы в связи с изменением конъюнктуры на мировом рынке – в США и Европе производство мяса индейки снижается. Так, из расчетов «Агрифуд Стретеджис» на основе данных Минсельхоза США следует, что выпуск этого вида мяса в стране упадет до 1,5 млн т (минус 1 млн т) уже к 2050 году. Это, по словам эксперта, негативный сценарий, но и позитивный не предполагает роста. «Нейтральный сценарий показывает, что Старый Свет, к сожалению, уходит с этого рынка», – говорит Давлеев. Основные причины падения производства в США – это яркая сезонность спроса, снижение потребления из-за уменьшающихся домохозяйств, растущая конкуренция и отсутствие инноваций. В Европе – уменьшение домохозяйств, регуляторные барьеры, а также сопоставление индейки с мясом бройлера, в том числе по цене, хотя из-за разницы в конверсии корма индейка не может конкурировать с ним. «Естественно, и из-за сокращения производства, а прежде всего из-за болезней, становится просто меньше индейки на прилавках», – отметил Давлеев.

Стратегические цели Национальной ассоциации производителей индейки до 2030 года – увеличить производство мяса индейки до 650 тыс. т (453 тыс. т в 2025-м, прогноз на 2026-й – 470 тыс. т), внутреннее потребление – до 5 кг в год на человека (2,9 кг в 2025-м), а долю экспорта от объема производства – с текущих 8% до 10% (около 65 тыс. т). Кроме того, среди приоритетов – внедрение индейки в социальное питание, и эта работа уже ведется, а также развитие производства этого вида мяса в отдаленных регионах.

Также в странах Старого Света активно растет себестоимость производства, но производители не могут увеличить свою маржинальность. Так, например, в Европе действует пятиступенчатая система доступа продукции на полки в зависимости от благополучия условий содержания птицы, что уже привело к росту себестоимости 1 кг бройлера на 20-40%. Аналогичных данных по индейке пока нет, но, по мнению Давлеева, этот подход увеличит расходы производителей как минимум на 20-25%. «Экономического стимула оставаться в этом сегменте для крупных, развитых рынков <...> нет. Когда-то, возможно, и мы придем к ситуации, когда достигнем пика производства <...>. Правда, я пока не вижу в ближайшей перспективе этого», – добавил эксперт.

В то же время за последние 10 лет производство индейки в России выросло в три раза, также положительную динамику показывает Польша, фиксируется прирост посадок птицы и в странах Северной Африки, Чили, Перу. «Это (сокращение производства в США и Европе) наши точки роста. Лидеры меняются <...>, все меняется. Россия вырывается вперед, вырывается вперед и Северная Африка. У нас гигантские нераспаханные поля экспортных рынков Юго-Восточной Азии, но для этого (освоения) нужен маркетинг», – уверен Давлеев. По его мнению, огромным потенциалом в плане сбыта обладают мусульманские страны: по этой причине и растут объемы производства в Северной Африке.

В то же время эпизоотические риски сохраняются и несут угрозу для птицеводов по всему миру, и к уже привычным гриппу птиц и болезни Ньюкасла присоединяется метапневмовирус. «То, к чему мы, на мой взгляд, пока не особо готовы – это вызов ближайших 10-20 лет – метапневмовирус <...>. В Америке от него пострадало от 60% до 80% поголовья. Именно он ударил по тем племенным хозяйствам, которые не могут сегодня дать достаточное количество инкубационного яйца на мировые рынки», – сказал эксперт, добавив, что первые случаи заболевания уже зафиксированы на Евразийском континенте.

Источник: agroinvestor.ru